**レジメン情報** **病院** 地域医療機能推進機構

| レジメンNO | TAS-102+Bev | レジメン名 | TAS-102+Bev | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 癌種別 | 大腸がん | 診療科 | 外科 | コース日数 | 28日 | コース数 | 標準[-] 最小[-] 最大[-] |

| NO | 種別 | 内容 | 数量 | 単位 | 開始 | 時間 | 0 | 1W | | | | | | | 2W | | | | | | | 3W | | | | | | | 4W | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 注射 | 生理食塩液「ヒカリ」 50mL | 1 | 瓶 | 00:00 | - | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | プライミング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 点滴静脈注射 | 1 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 注射 | 生理食塩液「ヒカリ」 100mL | 1 | 瓶 | 00:00 | - | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート注射液6．6mg 2mL | 3.3 | mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ボララミン注5mg 0．5%1mL | 1 | 管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 点滴静脈注射 | 1 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 注射 | 初回90分・2回目60分 | | | 00:00 | - | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液「ヒカリ」 100mL | 1 | 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (癌)アバスチン点滴静注用 | 5 | mg/Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30分で | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 点滴静脈注射 | 1 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 注射 | 生理食塩液「ヒカリ」 50mL | 1 | 瓶 | 00:00 | - | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 全開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 点滴静脈注射 | 1 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |