

レジメン情報		病院		地域医療機能推進機構																	
レジメンNO		FOLFIRI＋Bev(イメンド・ブチル)						レジメン名		FOLFIRI＋Bev(イメンド・ブチル)											
癌種別		大腸がん						診療科		外科			コース日数		14日	コース数		標準[-]	最小[-]	最大[-]	

NO	種別	内容	数量	単位	開始	時間	0	1W							2W						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	注射	ブロイメンド点滴静注用	1	瓶																	
		生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶																	
		30分で			00:00	-															
		点滴静脈注射	1	回																	
		デキサート注射液6. 6mg 2mL	6.6	mg																	
2	注射	アロキシ静注0. 75mg 5mL	1	瓶																	
		ボララミン注5mg 0. 5%1mL	1	管																	
		生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶			00:00	-													
		15分																			
		点滴静脈注射	1	回																	
3	注射	生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1	瓶																	
		全開			00:00	-															
		点滴静脈注射	1	回																	
		初回90分・2回目60分																			
		生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶																	
4	注射	(癌)アバステン点滴静注用	5	mg/Kg	00:00	-															
		30分で																			
		点滴静脈注射	1	回																	
		生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1	瓶																	
		ブチルスコボラミン臭化物注20mg「日医工」2%1...	1	管			00:00	-													
5	注射	全開																			
		点滴静脈注射	1	回																	
		※Rp6・Rp7同時に																			
		大塚糖液5% 250mL	1	袋																	
		(癌)レボホリナート点滴静注用	200	mg/m2	00:00	-															
6	注射	2時間																			
		点滴静脈注射	1	回																	
		※Rp6・Rp7同時に																			
		大塚糖液5% 250mL	1	袋																	
		(癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m2	00:00	-															
7	注射	2時間																			
		点滴静脈注射	1	回																	
		※(静脈注射)																			

8		(癌)フルオロウラシル注	400mg/m2	00:00	-	○														
		静脈内注射	1回																	
9	注射	※2.5mL／hr		00:00	-	○														
		生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1瓶																	
		(癌)フルオロウラシル注	2400mg/m2																	
		点滴静脈注射	1回																	