


「抗がん剤に関する 当院レジメンについて」

対象 連携保険薬局

* オンライン(ZOOM)開催

令和3年 2月 17日

さいたま北部医療センター 薬剤部 徳永洋子



化学療法追加レジメン


胃がん・大腸がん・
食道がん

オブジーボ	No	抗がん剤(商品名)	一般名	投与量(/m ²)	投与法	時間	投与日(d1,d8等)
		1オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	div	30分	d1 4w毎



脾がん

	No	誘がん剤(商品名)	一般名	投与量(㎡)	投与方法	時間	投与日(d1,d8等)
na1-SB+6FU/LV	1	オニパイド	イリリチカン塩酸塩水和物 リポソーム製剤	70mg/m ²	div	90分	d1
	2	レボホリナート	レボホリナート	200mg/m ²	div	120分	d1
	3	5FU	フルオロウラシル	2400mg/m ²	div	48時間	d1~d3

さいたま北部医療センター 薬剤部医薬品情報管理室




外来がん化学療法の質向上のための総合的な取組



患者に交付する文書

外来化学療法報告書


化学療法の経験を有する医師又は、化学療法に係る調剤の経験を有する薬剤師が、抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の文書を患者に交付すること。

[illegible]

外来化学療法報告書

[illegible]

「しびれ」の項目を追加しました




外来化学療法報告書

化学療法に携わる連携薬局先生方へ

レジメン情報等に基づく服薬指導、情報のフィードバックありがとうございます。

-副作用徵候記載箇所拡大-

創作用症状		症状		創作用症状		症状	
観察眼が鋭い	☐	突然2週間以上、突然を呼ぶ		シャッフル	☐	有	
多量の睡眠	☐	赤くなって、腫れている	痛みが来る	のど払い	☐	有	
発熱	☐	37度未満	37度以上	発熱	☐	有	
下痢	☐	有		皮膚	☐	有	
便秘	☐	有		しびれ	☒	有	
悪心	☐	有			☐		
吐き気	☐	有			☐		
口内炎	☐	有			☐		



情報共有について

連携薬局の先生方よりフィードバックされた患者情報等は電子カルテに保存し、更に各診療科へ文書にて情報共有しています。



JCHO 独立行政法人
さいたま市
地域医療機能推進機構