レジメン情報　　**病院**　地域医療機能推進機構

レジメンNO	FOLFIRI＋Bev（ブチル）	レジメン名	FOLFIRI＋Bev（ブチル）				
癌種別	大腸がん	診療科	外科	コース日数	14日	コース数	標準[-]　最小[-]　最大[-]

NO	種別	内容	数量	単位	開始	時間	0	1W 1	2	3	4	5	6	7	2W 8	9	10	11	12	13	14
1	注射	アロカリス点滴静注235mg　10mL	1	瓶	00:00	-		○													
		生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶																	
		30分で																			
		点滴静脈注射	1	回																	
2	注射	デキサート注射液6．6mg　2mL	6.6	mg	00:00	-		○													
		パロノセトロン静注0．75mg／5mL「ﾀｲﾎｳ」	1	瓶																	
		ポララミン注5mg　0．5%1mL	1	管																	
		生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶																	
		15分																			
		点滴静脈注射	1	回																	
3	注射	生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1	瓶	00:00	-		○													
		全開																			
		点滴静脈注射	1	回																	
4	注射	初回90分･2回目60分			00:00	-		○													
		生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶																	
		(癌)ベバシズマブBS点滴静注	5	mg/Kg																	
		30分で																			
		点滴静脈注射	1	回																	
5	注射	生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1	瓶	00:00	-		○													
		ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」2%1…	1	管																	
		全開																			
		点滴静脈注射	1	回																	
6	注射	※Rp6･Rp7同時に			00:00	-		○													
		大塚糖液5%　250mL	1	袋																	
		(癌)レボホリナート点滴静注用	200	mg/m2																	
		2時間																			
		点滴静脈注射	1	回																	
7	注射	※Rp6･Rp7同時に			00:00	-		○													
		大塚糖液5%　250mL	1	袋																	
		(癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m2																	
		2時間																			
		点滴静脈注射	1	回																	
8	注射	※(静脈注射)			00:00	-		○													
		(癌)フルオロウラシル注	400	mg/m2																	
		静脈内注射	1	回																	
9	注射	※2.5mL／hr			00:00	-		○													
		生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1	瓶																	
		(癌)フルオロウラシル注	2400	mg/m2																	
		点滴静脈注射	1	回																	